



Hong Kong Society
Of Nephrology

醫院管理局
HOSPITAL
AUTHORITY

Hong Kong Kidney
Foundation





第五屆世界腎臟日在香港

主題：每100個洗腎新症，46個由糖尿引致

七百名腎病病人及醫護人員參加二零一零年三月十四日舉行之活動。

主禮嘉賓：食物及衛生局副局長梁卓偉教授

出席嘉賓：香港醫院管理局胡定旭主席、香港腎臟基金會會長梁智鴻醫生、香港醫院管理局聯網服務總監張偉麟醫生、香港腎臟基金會主席雷兆輝醫生、香港腎科學會主席雷聲亮醫生、國際腎科學會常委李錦滔教授、亞太腎科學會主席陳德茂教授、香港糖尿病聯合會楊鐸輝醫生、香港腎臟基金會會董及香港腎科學會常委。



主辦機構於12個公共屋邨成功向2,575名市民進行糖尿病問卷調查，並由五位醫生解說調查結果：

- 13.6%受訪者患有糖尿病
- 37.8%不認識併發症
- 75%不知引致腎衰竭
- 17.6%不知看甚麼醫生
- 定期檢查有病覆診





「72租客之控糖保腎劇場」
(由唐國隆、周嘉歡、黃矩民、關子凱及馮加信醫生擔綱演出)



主辦機構於一月和二月（八個週日）在十二個公共屋邨，
成功向2,575名市民提供免費量血壓服務，
並進行「腎病及糖尿病」問卷調查。
調查結果由五位醫生在開幕典禮當日公佈。



電子傳媒專訪 七個電台及七個電視訪問節目





「腎病及糖尿病」之公眾講座





130名醫護人員出席 「腎病及糖尿病」之 專業講座





保護您的腎臟，控制糖尿病

主頁

請立即行動，參與2010
年3月11日世界腎臟日
吧！


世界腎臟日讓大眾意識到腎臟對整體健康的重要性，從而減少腎病及其相關的健康問題在全球的出現和影響。來年的活動主題將為「保護您的腎臟 - 控制糖尿病」。請一同支持和參與2010年3月11日世界腎臟日至2010年3月14日在香港舉辦的世界腎臟日！



關於世界腎臟日詳情 



香港腎科學會翻譯 「世界腎臟日」之中文網站



中文 Chinese Sign Up Sign In Search World Kidney Day GO

 11 March 2010

Protect your kidneys, Control diabetes

[Home](#) [My Page](#) [Get Involved](#) [About WKD](#) [About Kidney Diseases](#) [Events](#) [Community](#) [Media](#) [Resources](#)

I'm a patient

Many people are currently not aware that their kidneys are damaged and they might find out too late. Dialysis and transplantation can be prevented if kidney diseases are detected early. As a patient—there is something you can do—share your story and raise awareness of the risk factors for kidney disease with friends family and people you meet and you might just save a life!



Welcome to
World Kidney Day

[Sign Up](#)
[or Sign In](#)

ARE YOU OVER
50 YEARS OLD?

World Kidney Day

I'm a patient

I'm a medical
professional

I'm a sponsor

310
days away

保護您的腎臟 控制糖尿病



透過世界腎臟日，我們呼籲大家多注意腎臟健康，及早發現腎臟疾病及控制糖尿病對保護腎臟的重要性。從而減少腎病及其相關的健康問題在全球的出現和影響。

查閱更多有關腎臟及世界腎臟日的資料：
http://wkd.hksn.org/zh_tw/

世界腎臟日是由國際腎臟病學會 (the International Society of Nephrology) 和國際腎臟基金聯盟 (the International Federation of Kidney Foundations) 聯合提議設立

腎臟疾病你知幾多？

病因何在

數據顯示，多於5%的成年人患有某種腎臟疾病。常見引致慢性腎病的原因包括腎臟發炎、感染、尿道阻塞和遺傳病(如: 多囊腎病)。在發達和發展中國家，糖尿病和高血壓已逐漸成為最常見慢性腎臟疾病的病因。這些疾病也是導致心血管疾病的常見病因。

後果嚴重

隱性慢性腎病的首要後果是令腎功能逐漸喪失，慢慢發展成腎衰竭，甚至需要接受透析或腎臟移植等治療。其次，慢性腎臟病更使患者提早死於相關的心血管疾病，數目每年以數百萬計。

徵狀不顯

腎病病徵不明顯，大部份早期慢性腎病患者並不知道自己患病，當發現症狀時，病人可能已經到達末期階段，發展成腎衰竭，甚至需要接受透析治療。

及早檢查

腎功能檢查：血液樣本可檢驗肌酐含量和腎小球濾過率，而尿液樣本可量度肌酐和蛋白排泄，以得知腎功能。血糖檢驗可確定是否患上糖尿病。

適時治療

及早和適當的治療可減少腎臟的損害或心血管疾病的發生，早期腎病可以藥物控制，末期腎衰竭則以洗腎（洗血或洗肚），唯有移植腎臟才可以復原。（糖尿病及高血壓病人必須按醫生指示服藥）

提提你

您知道嗎？

腎臟每天都悉心地控制身體內的鹽分和水分，維持血壓不變。

護腎7招

腎病是無聲殺手，能大大影響您的生活質素。以下是幾個簡單的方法，有助降低患上腎臟疾病的風險。

多做運動、保持身體健康

多做運動和保持身體健康有助降低血壓和慢性腎病的風險。

控制血糖水平

大約一半的糖尿病人的腎功能已受損。因此，糖尿病病人必需定期檢查腎功能，以監測腎臟病進程度。病人應與醫生及其他護理專職人員討論控制血糖的方法。

定期監察血壓水平

大部份市民不知道高血壓是損害腎臟的最常見因素。高血壓前期的人士（即血壓在120/80mmHg至129/89mmHg的水平之間）應積極改善生活方式和飲食習慣；若血壓在140/90mmHg 或以上，則應與醫生討論患上各種慢性疾病的風險，並需要定期量度血壓。患有高血壓再加上其他風險因素（如糖尿病、高膽固醇和心血管疾病等），則更容易對腎臟造成損害。

維持良好的飲食習慣及控制體重

這有助於預防糖尿病、心臟病和其他由慢性腎病引

「腎病及糖尿病」之宣傳小冊子

糖尿病併發腎衰竭

糖尿病怎樣影響腎臟？

- 腎臟的毛細血管受到損壞，血液無法有效濾清，而各類毒素累積積聚於身體內。
- 病人初期會出現微量蛋白尿，隨後蛋白流失逐漸增加，腎功能逐步減退，當水和鹽分未能被有效排出時，就可能導致水腫和血壓上升。



糖尿病對腎臟的影響普遍嗎？

- 糖尿病可說是當今引致腎衰竭的最重要原因。
- 約半數糖尿病患者都有著或多或少的腎臟損傷。
- 在香港近幾年因為糖尿病引致腎衰竭而要接受透析治療的人數不斷上升，新個案中就有約四成是糖尿病人。

糖尿病如果影響了腎臟會有何後果？

糖尿病會把腎臟的毛細血管過濾功能永久破壞，以致功能逐漸衰退，除非進行透析治療（俗稱洗腎）或接受腎臟移植。否則病者在末期腎衰竭時生命將受到威脅。

怎樣才能避免這麼嚴重的後果？

糖尿病是不能被根治，但良好的控制絕對能防止腎臟受到損害，那就是要把血糖控制於接近正常值。

而控制飲食，適當的運動和藥物都是治療糖尿病的基石。



認識糖尿病 及病情控制

糖尿病是甚麼？

糖尿病屬慢性疾病，主要由於病者的胰島素分泌不足或身體未能夠有效使用胰島素，以致血糖升高而產生各種嚴重後果。

現時全世界有超過二億四千萬糖尿病患者，估計到了2025年，人數更會攀升至三億八千萬，這都是由於人口的上升和老化，以及隨著都市化生活所帶來的不良飲食，肥胖和缺乏運動而引致。

糖尿病分一型和二型

- 一型病者的胰腺未能分泌足夠胰島素，他們多需要注射胰島素以作治療，患者都比較年輕甚至是兒童。
- 二型病者的胰腺仍能分泌胰島素，可惜身體未能有效使用它，患者年齡多超過四十歲，但也可發生於較年輕者身上。

糖尿病對身體能產生何種病變？

血糖長期偏高將對身體產生嚴重後果，最常見是破壞細小血管，對心臟、腎臟、眼睛和神經線造成損壞。

糖尿病 怎麼預防？

健康飲食
多做運動
控制體重
定期驗身

糖尿病 併發腎衰竭

糖尿病怎樣影響腎臟？

腎臟的毛細血管受到損壞，血液無法有效濾清，而各種尿毒素將積聚於身體內。

病人初期會出現微蛋白尿，隨後蛋白流失逐漸增加，腎功能逐步減退，當水和鹽分未能被有效排出時，就可能導致水腫和血壓上升。

糖尿病對 腎臟的影響 若邊嗎？

- 糖尿病可說是當今引致腎衰竭的最主要原因。
- 約半數糖尿病患者都有著或多或少的腎臟損傷。
- 在香港近幾年因為糖尿病引致腎衰竭而要接受透析治療的人數不斷上升，新個案中就有約四成是糖尿病人。

糖尿病如果影響了腎臟會有何壞果？

糖尿病會把腎臟的毛細血管過濾功能永久破壞，以致功能逐漸衰退，除非進行透析治療（俗稱洗腎）或接受腎移植，否則病者在末期腎衰竭時生命將受到威脅。

怎樣才能避免 這麼嚴重的 壞果？

盡管糖尿病是不能被根治，但良好的控制絕對能防止腎臟受到損壞，那就是要把血糖控制於接近正常值。

而控制飲食，適當的運動和藥物都是治療糖尿病的基石。

「腎病及糖尿病」 之宣傳畫刊

你的 腎臟 健康嗎



有關腎臟疾病的自我風險評估

你的家人患有腎病：

有 無

你患有：

1. 糖尿病
2. 高血壓
3. 腎臟疾病，例如：
腎炎、尿道感染、腎石

你有下列徵狀：

1. 小便帶血/茶色尿(血尿)
2. 小便帶泡沫(蛋白尿)
3. 小便混濁(尿感染)
4. 小便赤痛、頻密
5. 小便感困難、不暢
6. 小便排出小沙石
7. 頻密夜尿
8. 腰脹腹疼痛
9. 足踝或眼皮浮腫

若上述答案答「有」，請聯絡你的家庭
醫生，你或需要進行一些檢驗以
確知你的腎臟健康狀況。



香港腎臟基金會



香港腎科學會



醫院管理局
HOSPITAL
AUTHORITY

網址：www.hkkf.org.hk

熱線：2716 5773

『腎臟疾病的自我風險評估』於多個網站、報章轉載，
並有小冊子在各診所派發。

第5屆世界腎臟日在香港



於六份報登之
章刊特刊

獻辭

第五屆世界腎臟日的主題是「保護你的腎臟 控制糖尿病」。糖尿病對腎臟健康具嚴重的威脅，可惜市民偏偏不知道，以2009年的最新數字顯示，香港新增因腎衰竭而洗腎的個案，46%是由糖尿病引致，可見糖尿病是引致腎衰竭的主要元兇。

現時全球約有68億人口，有5億人口患有腎臟疾病，而患糖尿病則有2.4億人口，據估計，到了2025年，糖尿病人口會增至3.8億，因而引致洗腎的新症將會同樣增加。本港目前約有七十萬名糖尿病患者，他們均屬有機會併發腎衰竭的人士，情況令人關注。

資料顯示，糖尿病是造成腎衰竭的主要原因，歐美與東亞情況都如是，然而東亞的情況更嚴重。各地因糖尿病引致腎衰竭的比例包括：歐洲30%、美國40%、香港46%，而馬來群島更高達57%，可見糖尿病導致洗腎的嚴重性。

目前，國際醫學機構對腎病及其相關的病因非常關注，因為腎病相當普遍，可惜不少患者發病初期不易察覺，但腎病所造成的傷害性相當大，包括要靠洗腎維持生命，因此，市民要加強警惕，加強對腎臟健康的關注。

無獨有偶，造成腎衰竭主因的糖尿病和血壓高，甚至腎臟早期發病均是屬於沒有明顯症狀的病症，因此，市民應要主動關注自己的身體健康、保持血糖、血壓和膽固醇維持在正常值，定期檢查身體，如有病變可以及早識別和進行治療。

至於目前已患有糖尿病的市民，大家必須認真控制病情，尤其要維持糖化血紅素(HbA1c)在正常值以內，減低出現併發症的風險，現時政府及醫院管理局非常重視糖尿病病人的病情控制，因此，糖尿病人必須加強自我監控，定期覆診及按指示用藥，不讓自己併發腎衰竭等嚴重病症。



香港腎臟基金會主席
雷兆輝醫生



香港腎科學會主席雷 聲亮醫生



香港醫院管理局聯網
服務總監張偉麟醫生